

Facteurs associés à la non-adhésion thérapeutique chez les patients asthmatiques : Une étude multicentrique en Algérie

P23

Auteurs : CHEBLI. I (1), CHELIGHEM.Z (2), ZEBBICHE.Y (1), AMZIANE.A (1), ABDENNOUR.S (2). DJIDJIK.R(1)

1 : Faculté de Pharmacie, Université Alger 1, 2 : Faculté de Médecine, Université de Constantine 3

Introduction

L'adhésion aux traitements pour l'asthme est un défi mondial clé influençant le contrôle de la maladie, les taux d'exacerbations, les hospitalisations, et les coûts de santé. Cette étude vise à évaluer l'adhésion thérapeutique chez les patients asthmatiques et à identifier les facteurs de non-adhésion.

Matériel et Méthode

La méthode adoptée pour ce travail est une étude descriptive transversale

La population d'étude : 390 patients asthmatiques

Lieu et Durée de l'étude : Constantine – Alger : du juillet 2023 a décembre 2023

Matériels : 2 Questionnaires (adhésion Morisky à 8 items+ connaissance à 12 items) + SPSS 25.0



Résultats et discussion

🌐 Démographie

•**Âge** : Adhésion réduite avec l'âge avancé.

•**Résidence** : Plus faible en zones rurales.

👔 Statut professionnel

•**Précarité** : Non-adhésion accrue chez les sans-emploi.

🛡️ Accès à l'assurance sociale

•**Non assuré** : Corrélation significative avec la non-adhésion.

🎓 Éducation et Connaissances

•**Faible éducation** : Facteur limitant l'adhésion.

•**Connaissances limitées** sur l'asthme.


⚠️ Effets secondaires et auto-médication

•**Effets indésirables** : Frein majeur à l'adhésion.

•**Auto-médication** : Corrélée à la non-adhésion.

📊 Corrélation avec exacerbations

•**Fréquence accrue** : Exacerbations dans **68 %** des cas de non-adhésion.



Conclusion

Les résultats révèlent des niveaux préoccupants de non-adhésion au traitement, mettant en lumière la nécessité de programmes d'éducation thérapeutique ciblant les obstacles identifiés pour améliorer le contrôle de la maladie et la qualité de vie des patients asthmatiques.